

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP 2-7-70 071170

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 36-01-74)

(~~ILLE-ET-VILAINE~~, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ~~MANCHE~~, MORBIHAN, ~~ORNE~~)

Sous-Régisseur de Recettes de la D.D.A. — Protection des Végétaux. Route de Fougères, RENNES  
C. C. P. RENNES 9404-94

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

SUPPLEMENT N° 2 AU BULLETIN N° 117

25 JUIN 1970

## AVERTISSEMENTS

### POMME DE TERRE

MILDIOU : Les pluies enregistrées en début de semaine dans plusieurs zones de notre région, et plus particulièrement dans le Finistère, vont permettre au Mildiou de se développer sur les variétés sensibles insuffisamment protégées.

Dans ces cultures, une sortie de taches aura lieu vraisemblablement dès les premiers jours de Juillet. Un risque grave de contamination sera alors à craindre.

Dans ces conditions, il est indispensable de renouveler la protection des cultures sensibles avant le 1er Juillet.

DORYPHORE : Avant de traiter contre le Mildiou, nous rappelons qu'il est nécessaire d'examiner les cultures afin de se rendre compte s'il n'est pas utile d'ajouter à la bouillie fongicide un insecticide contre le Doryphore.

### TOMATE

MILDIOU : Dans toutes les zones où cette affection se développe assez tôt, un premier traitement doit être effectué dès les prochains jours.

## INFORMATIONS

### MESURES PREVENTIVES CONTRE LES RAVAGEURS DES GRAINS STOCKES

Afin d'éviter l'infestation parfois très rapide des grains stockés par divers ravageurs (charançons, teigne, alucite, etc...) nous indiquons les précautions élémentaires qu'il convient de prendre avant la récolte :

- Nettoyage des locaux et du matériel : Brosser murs et plafonds, puis balayer le sol ou, mieux, nettoyer à l'aide d'un aspirateur assez

puissant. Les résidus ainsi rassemblés seront brûlés.

Le matériel d'exploitation (trieuses, élévateurs, tarares) sera également nettoyé avec soin.

- Désinfection des locaux vides : Effectuer une pulvérisation sur les murs ou parois ainsi que sur le sol, avec Lindane ou Malathion.

- Désinfection des sacs vides : L'emploi d'une solution à base de Lindane ou de Malathion par trempage ou pulvérisation des sacs permet d'éviter l'infestation des grains par des ravageurs qui s'y trouveraient avant leur remplissage.

L'Ingénieur  
chargé des Avertissements,

G. PAITIER.

L'Inspecteur  
de la Protection des Végétaux,

J. DELOUSTAL.

DESHERBAGE DES CHOUX FOURRAGERS ET POTAGERS  
(choux-fleurs exclus)

Les agriculteurs disposent actuellement de deux produits pour désherber les choux :

- La Trifluraline à la dose de 1,2 kg de matière active à l'hectare qui s'emploie en pré-semis ou en pré-plantation avec incorporation immédiate (au rotavator par exemple). Ce produit, très actif sur de nombreuses mauvaises herbes, est inefficace sur les crucifères.
- La Desmetryne à la dose de 0,250 kg (on peut aller jusqu'à 0,375 kg/ha si les adventices sont développées) de matière active à l'hectare qui s'utilise en post-levée, lorsque les choux ont 4 feuilles vraies (cas du semis direct) ou après la reprise (cas de repiquage). Cette triazine agit sur de nombreuses mauvaises herbes mais la sanve, la ravenelle, le chrysanthème des moissons et le gaillet gratteron sont résistants.

Ces produits, de faible rémanence, ont une action assez limitée dans le temps.

A. CRESPIY.  
Ingénieur d'Agronomie.